

Tilapia major clinical signs

(الأعراض الظاهرية الأكثر شيوعاً لأمراض أسماك البلطي)

الغرض من هذا الملصق هو تعزيز قدرة المزارعين ومقدمي الخدمات الإرشادية على التعرف على أهم أعراض الأمراض الشائعة في أسماك البلطي وتبليغ الجهات المختصة عند حدوث أيٍّ منها، حيث أن الوقاية والتعرف على الأعراض المرضية والتشخيص المبكر للمرض والتدخل السريع من أهم الخطوات للسيطرة على أمراض الأسماك. إذا لاحظت أيّاً من هذه الأعراض أو أي تغيير مفاجئ في سلوك الأسماك يجب الإتصال بأقرب خبير لصحة الأسماك للسيطرة على المشكلة.



Fish lethargic at surface and not feeding

وجود الأسماك بالقرب من سطح المياه مع الامتناع عن التغذية



Eye exophthalmia/popeye

جحوظ العين



Eye endophthalmia/eye shrinkage

التهاب باطن العين/انكماش العين



Eye opacification

عتامة العين



Skin discoloration and hemorrhagic lesion

تغير في لون جلد الأسماك مع وجود بقع نزفيه



Skin erosions

تآكل و خدوش بالجلد



Open wounds

جروح غائرة



Abdominal distension/swelling

انتفاخ/تورم بالبطن



Scale protrusion/detachment

بروز/تساقط القشور



Fish gasping air at the surface

طفو الأسماك إلى السطح لمحاولة استنشاق الهواء



Gill paleness (anemia)

شحوب الخياشيم



Gill rot

تعفن الخياشيم



Fin rot/tail rot

تآكل وتعفن في الذيل/الزعانف



Swollen anus

تورم الفتحة الشرجية

This tilapia disease extension material and photographs were developed by the CGIAR Research Program on Fish Agri-Food Systems (FISH) led by WorldFish. It was produced as part of the WorldFish better management practice (BMP) resources to support sustainable and responsible tilapia farming. The translation into Arabic language and printing of this material were funded by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) under the Aquaculture for Low Income Consumers (AquaLINC) project.