


ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যাড নিউট্রিশন অ্যাস্ট্রিভিটি ঘেরে বাগদা চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনা-১



নার্সারি ঘেরে বাগদা পিএল এর মজুদ ঘনত্ব

আয়তন	প্রতি বর্গমিটারে (সেগ্রা)	প্রতি শতাংশে (সেগ্রা)	প্রতি বিঘায় (সেগ্রা)	প্রতি একরে (সেগ্রা)
পিএল মজুদ ঘনত্ব	২৫-৩০	১০০০-১২০০	১০০০০-১২০০০	১০০০০০-১২০০০০

● নার্সারিতে পিএল মজুদের পূর্বে ১ ঘণ্টে ১.৫ ঘণ্টী ঘেরের পানিতে অঙ্গস্ত করে তারপর মজুদ করুন
● সকালে অথবা রাতে পিএল মজুদ করা উভয়

পিএল মজুদ পরিবর্তী ব্যবস্থাপনা

মতি সহজে ঘোরে ২০-০ ঘণ্টে ২০-০ প্রাম ডিমের পুরুতের পানিতে চিপিটা নিতে হবে।



অনেকাংশটি ঘোরের ০-৫ দিন পর প্রতি শতাংশে সরিবার ঘোর ৪০ প্রাম, অটোর্নি-১০০ প্রাম, চিপিটা-১০০ প্রাম এবং চিপিটা ৫ প্রাম ১০ প্রাম পরিমাণে সেগ্রা সিসিয়া ২৫-২২ ঘণ্টী ঘাসের ঘনত্বে পর প্রজ্ঞাগ করুন।

নার্সারিতে খাদ্য প্রয়োগ

নার্সারিতে প্রতি ১০০০ পিসি বাগদা পিএল এর জন্ম সৈনিক (৪ বার) খাদ্যের পরিমাণ

সপ্তাহ	প্রতি হাজার পিএল এর খাদ্য	সপ্তাহ	প্রতি হাজার পিএল এর খাদ্য
১ম	১০-১০ প্রাম	৪র্থ	৭০-৮০ প্রাম
২য়	৫০-৬০ প্রাম	৫ম	১০-১০০ প্রাম
৩য়	৫০-৬০ প্রাম	৬ষ্ঠ	১১০-১২০ প্রাম

সম্পূর্ণ খাদ্যের প্রকরণ:

- চিপিটা দৈরিক বৃক্ষ করে
- তোম মতিযোগ করে বৃক্ষ করে
- চিপিটা ব্যাক্টেরিওজি করে বিস্তৃত করে

সম্পূর্ণ খাদ্যের প্রকরণ:

- সৈনিক ঘাসের চাষ করা যাবে
- সুম্মুক অভ্যন্তরীণ করে যাবে
- অন্য অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে অধিক উৎপন্ন পদ্ধত্যা যাবে