



ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি বাগদা চিংড়ির পোনা মজুদপত্রবর্তী ব্যবস্থাপনা-৩

বাগদা চিংড়ির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির দেহের ওজন ও খাদ্যগ্রহণ মাত্রার ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন ১০০ কেজি বাগদার জন্য ১০ কেজি থেকে ২.২ কেজি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করুন। পুষ্টিসমৃদ্ধ মৎস্য খাদ্য উপকরণ খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করে এবং বাগদা চিংড়ির খাদ্য হজমে সহায়তা করে, ফলে ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চিংড়ির বয়স ও ওজন অনুসারে ১০০০ টি বাগদার দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের তালিকা

প্রতিটি বাগদার ওজন (গ্রাম)	প্রতি কেজিতে সংখ্যা (নিং)	খাদ্য প্রয়োগের হার (% বয়স ওজন)	দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ (গ্রাম প্রতি হাজার)	খাদ্যের ধরন
২-৪	৫০০-২৫০	১০.০-৭.০	২০০-২৮০	ক্রাফল
৬-৮	১৬৬-১২৫	৬.০-৫.০	৩৬০-৪০০	ক্রাফল
১০-১২	১০০-৮৩	৪.৫-৪.২	৪৫০-৫০০	স্টার্কার
১৪-১৬	৭১-৬৩	৪.০-৩.৮	৫৬০-৬০৮	স্টার্কার
১৮-২০	৫৬-৫০	৩.৬-৩.৫	৬৪৮-৭০০	স্টার্কার
২২-২৪	৪৫-৪২	৩.২-৩.০	৭০৪-৭২০	পিলেট
২৬-২৮	৩৮-৩৬	৩.০-২.৯	৭৮০-৮১২	পিলেট
৩০-৩২	৩৩-৩১	২.৭-২.৬	৮২৫-৮৩২	পিলেট
৩৪-৩৬	২৯-২৮	২.৫-২.৪	৮৫০-৮৬৮	পিলেট
৩৮-৪০	২৬-২৫	২.৩-২.২	৮৭৮-৮৮০	পিলেট

খাদ্য প্রয়োগের হার ও সময়

সকাল ৬:০০	দুপুর ১২:০০	বিকাল ৩:০০	রাত ৯:০০
০৫টি বাগদার ০.৫%	০৫টি বাগদার ০.৫%	০৫টি বাগদার ০.৫%	০৫টি বাগদার ০.৫%



সম্পূরক খাদ্যের চক্রত্ব

- চিংড়ির বৈধিক বৃদ্ধি করে
- সর্ষিক ফলসহ রান করা যায়
- প্রশংষিত প্রকারের বৃদ্ধি পায়
- মৃত্যুর কারণে মৃত্যু করে যায়

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা

- ১. চিংড়ি খাদ্য গ্রহণের সময় একে ছুঁতে নিষিদ্ধ থাকতে হবে
- ২. খাদ্যের ট্রে বাগদার করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
- ৩. চিংড়ি বা পুষ্টি দিয়া খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে



পানির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া

- চিংড়ির স্বাস্থ্যবিক বৃদ্ধি অস্বাস্থ্যকর
- চিংড়ি খাদ্য গ্রহণের ১ মাস পর অর্ধেক চিংড়ি মৃত্যু করে
- চিংড়ি মৃত্যুর হার বেড়ে নিরাসন হয়
- সর্বোচ্চ ১০০ বাগদারের সর্ষিক উপকরণ নির্ধারিত করে



নমুনাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

- চিংড়ির চিংড়ি ওজন নির্ণয় করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা
- খাদ্য গ্রহণের অবস্থা বুঝতে পারা
- চিংড়ি-পানির সম্পর্ক অবস্থা বুঝতে পারা
- চিংড়ির সর্ষিক বৃদ্ধি হার কি না পর্যবেক্ষণ করা



চিংড়ির নমুনাগ্রহণ ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ

অস্বাস্থ্য-বিধিক রোগ পরিলক্ষিত চিংড়ির নমুনাগ্রহণ ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের চক্রত্ব অবশ্যই। ১০ মাস মজুতের ১ মাস পর অর্ধেক চিংড়ি মৃত্যু করে খাদ্য গ্রহণ করে এবং প্রতি সপ্তাহে একবার নমুনাগ্রহণ করা উচিত। নমুনাগ্রহণের সর্ষিক ফলসহ পান্ডারের জন্য বেগে মজুতকৃত চিংড়ি-বড়-মধ্যমি সর্ষিকের কারণে ১০-৩০টি চিংড়ি মৃত্যু করে এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।